

この説明文書は、お薬とともに保管し、ご使用の際には、よくお読みください。

1日2回のコンタック

CONTAC[®] 600 PLUS

コンタック[®] 600プラス小児用

こども用

コンタック600プラス小児用は花粉・ほこりによるアレルギー性鼻炎や、かぜによる急性鼻炎にすぐれた効果を発揮します。ブソイドエフェドリン塩酸塩とリゾチーム塩酸塩で鼻づまりを緩和し、クロルフェニラミンマレイン酸塩でくしゃみや鼻みずをおさえます。また、鼻粘膜の炎症を和らげ、なみだ目、頭が重いなどの症状にも効果的です。速放性と徐放性の顆粒が混合された処方、服用後速やかに効果を発揮し、1日2回の服用で効き目が持続します。

⚠ 使用上の注意

本剤は小児用ですが、鼻炎用内服薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 次の症状がある人。
前立腺肥大による排尿困難
- (3) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、塩酸フェニルプロパノールアミンを含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)

4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
- (7) 次の診断を受けた人。 緑内障
- (8) モノアミン酸化酵素阻害剤(セレギリン塩酸塩等)で治療を受けている人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛
その他	排尿困難、顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック(アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

口のかわき、便秘

【効 能】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：
くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭が重い

【用法・用量】

下記の1回量を水又はお湯と一緒に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
7歳以上15歳未満	1カプセル	2回(朝・夕)
7歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)カプセルの取り出し方：図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強くおして裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



【成分と作用】

2カプセル(1日量)中に次の成分を含んでいます。

成分	含量	作用
プソイドエフェドリン塩酸塩	60mg	鼻粘膜の血管を収縮させて、充血やはれを抑え、鼻みず、鼻づまりを改善します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	4mg	アレルギー症状(鼻みず・くしゃみ・鼻づまり・なみだ目)を抑えます。
ベラドンナ総アルカロイド	0.2mg	鼻みず・なみだの過剰な分泌を抑えます。
無水カフェイン	50mg	鼻炎症状に伴う頭重を改善します。
リゾチーム塩酸塩	30mg(力価)	鼻粘膜の炎症を抑え、鼻づまりを緩和します。

添加物：トウモロコシデンプン、乳糖水和物、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、エチルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、タルク、部分アルファー化デンプン、ゼラチン、青色1号、ラウリル硫酸Na

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限*(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。
*使用期限とは、内袋(アルミの袋)を未開封の状態での使用期間をあらわします。

【お問い合わせ先】

- (1)購入した薬局・薬店
- (2)グラクソ・スミスクライン株式会社
コンシューマーヘルスケア事業本部 お客様相談室
【電 話】03-5786-6315
【受付時間】9:00~17:00(土、日、祝日を除く)
- (3)上記以外の時間で、誤飲、誤用、過量使用等の緊急のお問い合わせは下記機関もご利用いただけます。
連絡先：(財)日本中毒情報センター 中毒110番
電 話：072-727-2499(24時間、365日対応)

コンタックの他の製品情報やかぜと鼻炎に関する様々な情報は、PCや携帯電話から contac.jp へ

発 売 元： **グラクソ・スミスクライン株式会社** 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目6番15号
製造販売元： **佐藤薬品工業株式会社** 奈良県橿原市観音寺町9番地の2